


# #HERBE&FOURRAGES

## CLIMATOLOGIE


|                      | Températures<br>cumulées 2023 (en<br>°C depuis le 01/01) | Pluie cumulée 2023<br>(en mm) | Pluie sur 10 jours<br>(en mm) |
|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Charleville          | 526  | 273                           | 35                            |
| Linay                | 530  | 229                           | 50                            |
| Montcheutin          | 568  | 159                           | 29                            |
| Rocroi               | 434  | 358                           | 60                            |
| Saulces-Champenoises | 569  | 140                           | 26                            |



Le soleil fait son retour sur le département, et combiné au vent, il permet aux parcelles très arrosées de sécher rapidement. Les 550°C jour sont atteints sur la plupart des secteurs et sonnent la fin du déprimage pour les parcelles de fauche.

## SUIVI DE LA POUSSE

Hauteurs d'herbe (en cm) par site



La pousse fait un bon cette semaine avec près de 50 kg de matière sèche produite par jour en moyenne. Toutefois, attention aux écarts d'une parcelle à l'autre. Les prairies temporaires explosent, mais les parcelles mal orientées ou sous fertilisées prennent leur temps. Des gelées matinales ont aussi pu pénaliser la pousse par endroit.

## POINT DE SITUATION



La plupart des parcelles sèchent assez rapidement, même s'il reste des zones humides localisées. Évaluez la portance au cas par cas.

Les prunelliers sont en fleur. On les reconnaît à leurs fleurs blanches qui apparaissent avant le feuillage. Ils sont généralement un bon point de repère pour la mise à l'herbe.

*Bon à savoir : cette essence est consommable par les animaux et est utilisée en haie fourragère l'été.*

## CONSEILS DE LA SEMAINE

Si vos stocks fourragers sont très limitants, sortez les animaux sur les parcelles les plus portantes (selon les secteurs le ressuyage est assez rapide) pour commencer.

N'hésitez pas à diminuer le chargement (50 ares par UGB ou plus) pour les parcelles humides et lors des épisodes pluvieux à venir. Cela limitera la dégradation des sols sensibles tout en assurant la consommation de l'herbe pour ne pas être débordé dans quelques semaines.

Pour les éleveurs qui ont déjà réalisé un tour de pâturage et si la repousse est lente, essayez de remettre d'autres parcelles à disposition pour allonger le temps de rotation si vous êtes en pâturage tournant, et/ou adaptez la complémentation à l'auge afin d'éviter le surpâturage. Cela devrait permettre de gagner les quelques jours nécessaires pour obtenir des hauteurs d'herbe satisfaisantes. Pour rappel on vise 8-10 cm à l'entrée et jusqu'à 4 cm à la sortie en cette saison.

## EVENEMENTS A VENIR

Formation « Prairies et haies : quelles plantes bénéfiques pour mes animaux ? » avec l'intervention de Coralie AMAR, Vétérinaire membre du GIE Zone Verte, le 18 avril à Villers-Semeuse, **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 6 AVRIL**

Tours de plaine « Cultures fourragères : conjuguer production, autonomie fourragère et qualité de l'eau » :

🌻 le 11 avril à 13h45 à la Salle des fêtes de Puilly-et-Charbeaux

🌻 le 12 avril à 9h45 à la Salle des fêtes de St Marcel

**INSCRIPTION SOUHAITEE AVANT LE 11 AVRIL**

🌻 le 13 avril à 9h45 à la Mairie de Cheveuges



**Contact : Adèle RAYNAUD**

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

[adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr](mailto:adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr)

